

ノリ養殖情報 第9号

平成26年10月31日（採苗16日後）
福岡県水産海洋技術センター有明海研究所

1 養殖状況

現在、網の展開作業が行われています。

2 海況（31日満潮時・右表）

水 温：平均20.2℃で、 平年より0.8℃高めでした。

比 重：平均21.8でした。

栄養塩：平均5.4マイクロ（ $\mu\text{g}\cdot\text{at/l}$ ）でした。

カラマのため沖側が低めでした。

プランクトン：沈殿量は横ばいです。種類は珪藻（コシノディスカス等）と動物でした。

3 ノリの生長など（31日の大和高田ノリ芽検診：網糸28本）

- ・最大葉長の平均は7ミリでした。
- ・すべての網で二次芽が確認されました。
- ・芽イタミは2割の網で認められましたが、すべて軽症でした。
- ・アオノリは85%の網で認められました。

4 今後の管理

- ・網の高さは、4日以降はハラで1.5～1.6mを目安としてください。
ただし、乾燥過多・不足にならないように、天候によって網の高さを調節してください。

【アオノリ対策の活性処理】

- ・期間は10/29～11/8です。
- ・アオノリの着生が多く認められる網のみ処理を行ってください。
- ・処理液は再利用を行い、廃液は必ず陸上で処分してください。海上への投棄は厳禁です。

◎次回の情報は、11月2日（日）20時に発行予定です。

10月31日（旧暦8日）満潮時の海況

漁場名	調査点	水温 (℃)	比重	栄養塩 ($\mu\text{g}\cdot\text{at/L}$)	プランクトン (cc/100L)
4号	1	19.8	19.0	17.5	0.5
6(2)号	12	20.2	22.5	1.8	—
七つはぜ	11	20.2	22.0	2.3	0.9
よりあわせ	A	19.9	19.6	17.3	—
えどなかつ	2	20.0	20.0	10.8	—
にしのつ	3	19.9	20.5	7.5	0.7
たかつ	4	20.2	21.6	1.9	—
せいどまり	B	20.3	22.0	1.0	1.0
13号	10	20.0	21.0	9.9	—
20号	9	19.9	21.4	8.7	0.5
24号	8	19.9	21.6	8.1	—
ひゃっかん	5	20.4	22.2	1.2	0.7
22(1)号	6	20.7	23.0	0.5	—
25号	7	20.1	22.1	3.0	0.8
33号	16	20.6	23.2	0.8	—
43号	13	20.9	23.1	0.3	1.1
43号	14	20.1	22.1	7.2	—
44号	15	20.8	23.2	2.2	0.8
45号	C	20.7	23.2	1.3	—
平 均		20.2	21.8	5.4	0.8

※プランクトン沈殿量は速報値です。