

1 養殖状況

摘採は早いところでは3日から始まり、6日から本格化しています。

2 海況（8日満潮時・右表）

水 温：平均9.6℃で、平年より約1℃低めでした。

比 重：平均22.0でした。

栄養塩：平均12.0マイクロ（ $\mu\text{g}\cdot\text{at/l}$ ）でした。

プランクトン：平均0.6cc/100lでした。種類は動物と珪藻（リゾソレニア等）でした。

3 ノリの病害等（8日調査、右表）

- ・付着細菌は確認されませんでした。
- ・原形質吐出は、中度1点（調査点13）、軽度1点（調査点14）が確認されました。
- ・アカ、ツボは確認されませんでした。
- ・色落ちは確認されませんでした。

4 今後の管理

- ・今後小潮に向かい、ノリが急激に伸びると予想されます。
- ・伸ばしすぎるとクモリやすくなりますので、干出を十分にとってください。
- ・摘採サイズに達した網はすみやかに摘採してください。
- ・干出は、朝方の干潮時に3～4時間を基本としてください。
- ・網の高さはハラで、11日までは1.8m、12日以降は2.1mを目安とし、潮の引き具合、天候により現場で調整を行ってください。
- ・活性処理を行う場合、希釈倍率は150～200倍を目安とし、処理液の再利用を必ず行ってください。

◎次回の情報は13日(火)19時頃に発行予定です。

1月8日（旧暦18日）満潮時の海況

漁場名	調査点	水温 (℃)	比重	栄養塩 ($\mu\text{g}\cdot\text{at/L}$)	プランクトン (cc/100L)
4号	1	9.2	17.8	27.5	0.9
6(2)号	12	10.0	22.6	9.5	—
七つはぜ	11	9.6	22.1	11.6	0.6
よりあわせ	A	8.8	20.2	20.0	—
えどなかつ	2	9.5	21.2	15.0	—
にしのか	3	9.3	21.6	12.4	0.6
たかつ	4	9.4	21.8	11.5	—
せいどまり	B	9.4	22.8	10.3	0.5
13号	10	9.6	21.2	14.7	—
20号	9	9.7	22.6	9.9	0.5
24号	8	9.7	22.6	10.2	—
ひやっかん	5	9.5	22.1	11.0	0.6
22(1)号	6	9.8	22.6	8.9	—
25号	7	9.7	22.6	8.7	0.9
33号	16	10.1	22.8	8.7	—
43号	13	10.1	22.7	8.7	0.8
43号	14	10.1	23.0	8.5	—
44号	15	10.0	23.1	8.3	0.5
45号	C	欠測	欠測	欠測	—
平 均		9.6	22.0	12.0	0.6

※プランクトン沈殿量は速報値です。