ノリ養殖情報 第2号

平成27年10月6日

福岡県水産海洋技術センター有明海研究所

1 養殖概況

吊り網の設置など採苗に向けての作業が行われています。

2 海況（5日満潮時・右表）

水温：平均23.4℃と、平年より0.4℃低めでした。

比重：平均20.8でした。

栄養塩：平均14.4マイクロ（ $\mu\text{g}\cdot\text{at}/\text{L}$ ）でした。

プランクトン：主な種類は、動物プランクトンと夜光虫でした。

3 採苗時の管理

- ・採苗は10月14日の午前6時30分以降の出港です。
- ・ラッカサンにカキ殻を入れる際は、カキ殻の乾燥と地面の温度に注意してください。
- ・芽付きは、網糸1cmあたり35～50個が適正です。（蛍光100倍1視野当たり、新型顕微鏡は7～10個、旧型顕微鏡は5～7個）。
- ・タネは午前10時頃まで付きますので、午前10時以降に切った網糸を検鏡し、芽数を判断してください。
- ・健全なノリ芽を育てるため、十分な干出を与えてください。
- ・網の水位は、ハラで1.4mを目安としてください。なお、乾燥不足・乾燥過多にならないよう天候により網の高さを調節してください。

※10月10日（土）～12日（祝日）は、研究所でカキ殻の検鏡を行います。

検鏡時間は、9:00～12:00です。

10月5日（旧暦23日）満潮時の海況

漁場名	調査点	水温 (°C)	比重	栄養塩 ($\mu\text{g}\cdot\text{at}/\text{L}$)	プランクトン (cc/100L)
4号	1	23.2	18.1	26.2	0.1
6(2)号	12	23.6	22.1	9.5	-
七つはぜ	11	23.7	22.4	9.5	0.2
よりあわせ	A	23.3	15.3	34.8	-
えどなかつ	2	23.5	21.6	13.2	-
にしのかつ	3	23.0	18.7	20.2	0.1
たかつ	4	23.4	20.5	12.8	-
せいどまり	B	23.1	19.0	15.9	0.2
13号	10	23.2	20.9	15.0	-
20号	9	23.2	20.6	14.4	0.1
24号	8	23.2	20.2	20.6	-
ひやつかん	5	23.3	21.5	13.0	0.2
22(1)号	6	23.6	22.0	10.3	-
25号	7	23.6	22.4	10.3	0.2
33号	16	23.4	21.5	12.0	-
43号	13	23.6	22.4	9.4	0.4
43号	14	23.4	21.8	10.9	-
44号	15	23.7	22.1	8.4	0.3
45号	C	23.2	21.7	7.9	-
平均		23.4	20.8	14.4	0.2

※プランクトン沈殿量は速報値です。