

ノリ養殖情報 第4号

平成27年10月23日(採苗9日後)
福岡県水産海洋技術センター有明海研究所

1 養殖状況

現在、人工干出や網洗い作業が行われています。

2 海況(22日満潮時・右表)

水温: 平均22.2℃と、平年より1℃高めでした。

比重: 平均22.7でした。

栄養塩: 平均10.9マイクロ($\mu\text{g}\cdot\text{at/L}$)でした。

プランクトン: 主な種類は、動物と珪藻(コシノディスカス)でした。

3 ノリの生長など(23日のノリ芽検診結果: 網糸58本)

- ・最大葉長の平均は約0.5ミリでした。
- ・二次芽の着生が始まっていました。
- ・芽イタミは65%(軽症53%、中症12%)の網で認められました。
- ・アオノリは38%の網で認められました。
- ・ヒゲは認められませんでした。

4 今後の管理

- ・二次芽の着生を促すため、徐々に干出を強めてください。
 - ・網の高さはハラで、24日は1.4m、25日以降は1.2mを目安としてください。
- ただし、現場の潮のひき具合や気象状況、重ね網の枚数により、干出不足・過多とならないよう、網の高さを調節してください。

10月22日(旧暦10日)満潮時の海況

漁場名	調査点	水温(℃)	比重	栄養塩($\mu\text{g}\cdot\text{at/L}$)	プランクトン(cc/100L)
4号	1	22.2	23.1	12.3	0.3
6(2)号	12	22.1	23.2	8.5	-
七つはぜ	11	22.1	23.2	8.9	0.3
よりあわせ	A	22.2	20.4	19.8	-
えどなかつ	2	22.2	22.7	12.7	-
にしのおつ	3	22.2	21.1	14.5	0.1
たかつ	4	22.1	22.5	12.2	-
せいどまり	B	22.1	21.4	14.0	0.2
13号	10	21.9	22.5	14.7	-
20号	9	22.2	22.8	10.9	0.3
24号	8	22.4	23.0	10.0	-
ひやつかん	5	22.1	23.0	7.8	0.3
22(1)号	6	22.3	23.1	8.3	-
25号	7	22.4	23.0	9.6	0.3
33号	16	22.4	23.4	8.4	-
43号	13	22.4	23.4	7.7	0.3
43号	14	22.3	23.0	10.2	-
44号	15	22.4	23.6	7.4	0.2
45号	C	22.3	23.4	9.6	-
平均		22.2	22.7	10.9	0.2

※プランクトン沈殿量は速報値です。