

海況速報-28

平成29年3月17日
福岡県水産海洋技術センター有明海研究所

漁場名	調査点	水温(°C)		比重			栄養塩 ($\mu\text{g}\cdot\text{at}/\text{L}$)			プランクトン (cc/100L)			色落ちの状況			アカ			ツボ		
		3月13日 (旧16日)	3月17日 (旧20日)	3月10日 (旧13日)	3月13日 (旧16日)	3月17日 (旧20日)	3月10日 (旧13日)	3月13日 (旧16日)	3月17日 (旧20日)	3月10日 (旧13日)	3月13日 (旧16日)	3月17日 (旧20日)	3月10日 (旧13日)	3月13日 (旧16日)	3月17日 (旧20日)	3月10日 (旧13日)	3月13日 (旧16日)	3月17日 (旧20日)	3月10日 (旧13日)	3月13日 (旧16日)	3月17日 (旧20日)
4号	1	11.8	12.8	16.1	17.9	23.1	24.8	15.2	0.2	0.8	2.0	1.3	○	○	○	★	○	●	▲	●	●
6(2)号	12	11.6	12.6	20.0	23.1	23.2	0.0	0.0	0.0	-	-	-	○	●	●	★	○	○	●	●	●
七つはぜ よりあわせ	11 A	11.6	12.5	20.7	23.4	23.1	3.3	0.0	0.1	4.1	6.4	1.5	○	▲	▲	▲	●	○	▲	●	●
		12.0	12.1	19.0	20.3	20.6	10.7	6.5	6.9	-	-	-	○	○	○	★	●	○	▲	▲	▲
えどなかつ	2	12.0	12.2	20.1	23.1	22.7	1.8	0.5	1.1	-	-	-	○	○	○	★	●	○	●	●	●
にしのつ	3	11.8	12.4	20.4	22.4	22.1	1.7	1.1	1.7	2.1	3.1	2.0	○	○	●	★	★	●	●	●	★
たかつ	4	11.6	12.3	21.5	23.4	22.4	0.3	0.0	0.9	-	-	-	▲	★	★	★	●	○	●	●	○
せいどまり	B	11.7	12.3	21.5	23.0	22.6	0.9	0.6	1.9	3.3	4.5	1.3	▲	★	欠測	★	★	欠測	○	○	欠測
13号	10	11.8	12.7	19.9	23.4	23.1	0.8	0.0	1.0	-	-	-	●	★	▲	★	○	○	●	○	●
20号	9	12.1	12.7	19.5	23.6	22.7	1.8	0.4	0.6	1.8	2.4	1.3	●	★	★	○	○	●	●	○	●
24号	8	12.1	12.7	19.9	23.6	23.2	3.4	0.8	0.3	-	-	-	▲	★	★	○	★	○	○	○	○
ひゃっかん	5	11.5	12.2	22.3	23.4	22.7	0.0	0.0	0.0	3.3	5.2	2.5	●	★	★	○	●	○	●	●	○
22(1)号	6	11.6	12.3	22.3	23.7	23.1	0.0	0.0	0.0	-	-	-	★	★	★	★	●	○	○	○	○
25号	7	11.8	12.6	22.4	23.7	23.5	0.0	0.0	0.5	4.2	3.0	1.6	★	★	★	★	★	○	○	●	○
33号	16	11.8	12.3	22.7	23.5	23.1	0.0	0.0	0.0	-	-	-	★	★	★	○	○	○	○	○	○
43号	13	11.9	12.5	20.5	23.6	23.2	14.6	0.0	0.2	1.7	2.5	1.1	★	★	★	○	●	○	○	○	○
43号	14	12.2	12.5	21.8	23.2	23.0	3.5	6.1	10.7	-	-	-	▲	●	▲	○	●	○	○	○	○
44号	15	12.0	12.6	21.6	24.0	23.7	7.7	0.0	0.3	4.7	1.3	0.3	▲	★	★	●	○	○	○	○	○
45号	C	12.0	12.5	23.0	24.0	24.2	0.0	0.0	0.0	-	-	-	★	▲	★	●	○	○	○	○	○
平均		11.8	12.5	20.8	23.0	22.9	4.0	1.6	1.4	2.9	3.4	1.4	13/19地点	15/19地点	15/18地点	13/19地点	12/19地点	3/18地点	10/19地点	9/19地点	8/18地点

※17日のプランクトン沈殿量は速報値です。
色落ち・アカ・ツボの程度:○なし、●軽度、▲中度、★重度または大量感染

- ・水温は平均 12.5°Cと、平年より約1°C高めでした。
- ・比重は平均 22.9でした。
- ・栄養塩は平均1.4マイクロ($\mu\text{g}\cdot\text{at}/\text{L}$)でした。
- ・プランクトン沈殿量は平均1.4cc/100Lで、主な種類は珪藻(スケルトネマ等)でした。
- ・アカは18地点中3点で確認され、すべて軽度でした。
- ・ツボは18地点中8点で確認され、軽度6点、中度1点、重度1点でした。
- ・色落ちは18地点中15点で確認され、軽度2点、中度3点、重度10点でした。
- ・長伸ばしせず、早めの摘採を心がけてください。
- ・生産につながらない網は、撤去を行ってください。