

アカ感染拡大！

12月5日（旧暦7日）満潮時の海況

漁場名	調査点	水温 (°C)	比重	栄養塩 ($\mu\text{g}\cdot\text{at}/\text{L}$)	プランクトン (cc/100L)	アカ
4号	1	15.3	17.2	30.0	0.2	●
6(2)号	12	16.5	22.0	8.6	-	●
七つはぜ	11	16.2	21.1	9.6	0.1	●
よりあわせ	A	15.0	17.8	26.1	-	●
えどなかつ	2	15.5	20.1	13.5	-	●
にしのかつ	3	15.8	20.7	11.8	0.1	●
たかつ	4	15.7	20.6	12.1	-	●
せいどまり	B	15.8	20.5	12.9	0.1	▲
13号	10	15.9	20.2	16.2	-	▲
20号	9	15.9	20.7	14.4	0.1	▲
24号	8	16.0	21.0	14.1	-	★
ひゃっかん	5	16.5	21.7	8.4	0.1	●
22(1)号	6	16.7	22.2	5.9	-	●
25号	7	16.4	22.1	12.5	0.1	▲
33号	16	16.8	22.5	6.0	-	●
43号	13	16.7	22.2	9.2	0.1	▲
43号	14	16.1	21.5	22.4	-	●
44号	15	16.7	22.6	8.5	0.2	▲
45号	C	16.7	22.5	8.3	-	●
平均		16.1	21.0	13.2	0.1	19/19地点

1 養殖状況

現在3～4回目の摘採が行われています。

11月30日の組合長会議で、秋芽網の撤去完了日は12月18日、冷凍網出庫は12月23日午前6時以降の出港と決定されました。

2 海況（5日満潮時・右表）

水温：平均16.1°Cと、平年より約2°C高めでした。

比重：平均21.0でした。

栄養塩：平均13.2マイクロ ($\mu\text{g}\cdot\text{at}/\text{L}$) でした。

プランクトン：少ない状況でした。渦鞭毛藻（アカシオ・サンガイネア）による赤潮が引きつづき発生しています。

潮位：現在、干潮時の潮位は潮汐表より約20cm高い状況です。

3 ノリの病害など（5日調査、右表）

・アカは19調査点中全点で感染が確認され、軽度12点、中度6点、重度1点でした。

・ツボは確認されませんでした。

4 今後の管理

・アカの感染が再び拡大しています。

・ノリを長伸ばしせず、早めの摘採を心がけてください。

・網の高さは、吊り口で2.8m以上を維持してください。

・活性処理の使用期間は12月5～10日です。処理を行う場合は、処理液の再利用を必ず行ってください。

◎12月23日からの冷凍網出庫後の網の高さは、ハラで1.8m（吊り口で2.0m）を目安としてください。

※プランクトン沈殿量は速報値です。

アカの程度：●軽度、▲中度、★重度