

ノリ養殖情報 第7号

平成30年11月12日（採苗18日後）
福岡県水産海洋技術センター有明海研究所

1 養殖概況

網の展開作業が行われています。

2 海況（12日満潮時・右表）

水温：平均18.5℃と、平年より約1℃高めでした。

比重：平均22.5でした。

栄養塩：平均3.3マイクロ（ $\mu\text{g}\cdot\text{at}/\text{L}$ ）でした。

プランクトン：主な種類は珪藻（コシノディスカス等）と夜光虫でした。

潮位：本日の干潮時で、潮汐表よりも約10cm低い状況でした。

3 今後の管理

- 一部で色のうすいノリが確認されました。
- 栄養塩は、前回調査時より増加しています。依然少ない状況ですが今後、カラマに向かうため、岸寄りの漁場では増加が見込まれます。
- 可能な限り、岸寄りの漁場で育苗を進めてください。
- 「網の高さ」は、ハラで1.5mを目安としてください。天候によって網の高さを調節してください。

11月12日（旧暦5日）の海況

| 漁場名 | 調査点 | 水温 (°C) | 比重 | 栄養塩 ($\mu\text{g}\cdot\text{at}/\text{L}$) | プランクトン (cc/100L) | 色調 | |
|--------|-----|------------|------|---|---------------------|----|-----|
| | | | | | | 正常 | うすい |
| 4号 | 1 | 17.2 | 18.5 | 17.3 | 0.4 | ○ | |
| 6(2)号 | 12 | 18.8 | 22.9 | 1.5 | - | ○ | |
| 七つはげ | 11 | 18.6 | 23.0 | 1.3 | 1.0 | ○ | |
| よりあわせ | A | 17.7 | 20.3 | 11.1 | - | - | - |
| えどなかつ | 2 | 18.3 | 22.3 | 1.3 | - | ○ | |
| にしのつ | 3 | 18.1 | 21.8 | 4.3 | 0.9 | ○ | |
| たかつ | 4 | 18.6 | 22.3 | 1.9 | - | | ○ |
| せいどまり | B | 18.3 | 22.3 | 2.5 | 1.0 | | ○ |
| 13号 | 10 | 18.5 | 22.8 | 0.9 | - | ○ | |
| 20号 | 9 | 18.5 | 22.9 | 0.8 | 0.7 | | ○ |
| 24号 | 8 | 18.7 | 22.9 | 1.7 | - | | ○ |
| ひやつかん | 5 | 18.5 | 22.8 | 2.6 | 1.1 | - | - |
| 22(1)号 | 6 | 18.8 | 22.8 | 1.2 | - | | ○ |
| 25号 | 7 | 19.0 | 23.3 | 1.0 | 0.8 | | ○ |
| 33号 | 16 | 19.0 | 23.4 | 1.0 | - | | ○ |
| 43号 | 13 | 19.0 | 23.4 | 0.9 | 0.9 | ○ | |
| 43号 | 14 | 18.2 | 22.5 | 9.9 | - | | ○ |
| 44号 | 15 | 19.0 | 23.5 | 0.9 | 1.0 | ○ | |
| 45号 | C | 19.2 | 23.9 | 1.0 | - | | ○ |
| 平均 | | 18.5 | 22.5 | 3.3 | 0.9 | | |

※プランクトン沈殿量は速報値です。