

1 養殖概況

全域で摘採が行われています。

2 海況（3日満潮時・右表）

水温：平均14.0℃と、平年より約1℃低めでした。

比重：平均19.5でした。

栄養塩：平均22.0マイクロ（ $\mu\text{g}\cdot\text{at}/\text{L}$ ）でした。

プランクトン：主な種類は動物でした。

3 ノリの病害（3日調査）

- ・アカは8調査点で確認され、軽度6点、中度2点でした。
- ・ツボは確認されませんでした。
- ・ヒアカは14調査点で確認され、軽度12点、中度2点でした。

4 今後の管理

- ・顕微鏡サイズのアカの感染が拡大しています。
- ・アカを干し殺すために、摘採の有無に関わらず、網の高さを、
12月8日までは、ハラで2.4m（吊り口で2.7m）以上としてください。
- ・摘採サイズに達した網は、すみやかに摘採し、網を軽くしてください。

12月3日（旧暦7日）の海況

| 漁場名 | 調査点 | 水温 (℃) | 比重 | 栄養塩 ($\mu\text{g}\cdot\text{at}/\text{L}$) | プランクトン (cc/100L) | アカ | ツボ | 葉長 (cm) |
|--------|-----|-----------|------|---|---------------------|--------|--------|------------|
| 4号 | 1 | 13.6 | 15.2 | 37.3 | 0.01 | ▲ | ○ | 35 |
| 6(2)号 | 12 | 14.9 | 21.7 | 11.1 | - | ● | ○ | 12 |
| 七つはげ | 11 | 13.6 | 18.3 | 21.3 | 0.01 | ● | ○ | 15 |
| よりあわせ | A | 14.1 | 16.3 | 32.2 | - | ○ | ○ | 12 |
| えどなかつ | 2 | 14.6 | 20.2 | 17.9 | - | ○ | ○ | 12 |
| にしのつ | 3 | 14.0 | 19.1 | 21.1 | 0.02 | ○ | ○ | 20 |
| たかつ | 4 | 14.4 | 20.2 | 15.6 | - | ● | ○ | 18 |
| せいどまり | B | 14.1 | 19.3 | 20.1 | 0.01 | ▲ | ○ | 18 |
| 13号 | 10 | 13.7 | 16.7 | 27.3 | - | ○ | ○ | 12 |
| 20号 | 9 | 13.6 | 19.2 | 18.7 | 0.01 | ● | ○ | 25 |
| 24号 | 8 | 13.9 | 20.2 | 13.2 | - | ● | ○ | 25 |
| ひゃっかん | 5 | 14.2 | 22.2 | 10.6 | 0.02 | ○ | ○ | 8 |
| 22(1)号 | 6 | 14.4 | 21.1 | 12.2 | - | ○ | ○ | 7 |
| 25号 | 7 | 14.0 | 21.2 | 10.9 | 0.01 | ○ | ○ | 28 |
| 33号 | 16 | 15.6 | 22.3 | 10.9 | - | ○ | ○ | 10 |
| 43号 | 13 | 12.9 | 19.1 | 19.6 | 0.01 | ● | ○ | 30 |
| 43号 | 14 | 13.8 | 20.5 | 19.9 | - | ○ | ○ | 20 |
| 44号 | 15 | 13.5 | 18.7 | 42.9 | 0.01 | ○ | ○ | 22 |
| 45号 | C | 13.8 | 18.3 | 54.9 | - | ○ | ○ | 30 |
| 平均 | | 14.0 | 19.5 | 22.0 | 0.01 | 8/19地点 | 0/19地点 | 19 |

アカ・ツボの感染程度：○感染なし、●軽度、▲中度
※プランクトン沈殿量は速報値です。