

1 採苗前日の注意点

ラッカサンにカキ殻を入れる際は、カキ殻の乾燥と地面の温度に注意してください。

2 採苗時の管理

- ・網の水位は、30日までは、ハラで1.0m以上を目安とし、31日以降は、ハラで1.5m以上を目安としてください。
- ・漁場によっては、低張りをすると比重の低い海水に浸かるため、タネが付きにくくなる恐れがあります。過度な低張りはしないでください。
- ・タネは午前10時頃まで付きます。
午前10時以降に切った網糸を検鏡し、芽数を判断してください。
- ・芽付きは、網糸1cmあたり35～50個が適正です。
(蛍光100倍1視野当たり、新型顕微鏡は7～10個、旧型顕微鏡は5～7個)
- ・芽付きが厚くならないよう適正数に達したら、すみやかにラッカサンをはずしてください。
- ・健全なノリ芽を育てるため、十分な干出を与えてください。

3 海況(21日満潮時・右表)

水温：平均21.4℃と、平年より0.4℃高めでした。

比重：平均21.4でした。

栄養塩：平均19.0マイクロ(μg・at/L)でした。

プランクトン：主な種類は珪藻(コシノディスカス)でした。

研究所では、
10月22日(火)9:00～12:00
10月26日(土)9:00～12:00に検鏡を実施します。

10月21日(旧暦23日)満潮時の海況

漁場名	調査点	水温(℃)	比重	栄養塩(μg・at/L)	プランクトン(cc/100L)
4号	1	21.7	19.5	26.9	0.2
6(2)号	12	21.1	22.4	16.5	—
七つはぜ	11	21.5	21.9	15.3	0.4
よりあわせ	A	21.2	17.5	33.3	—
えどなかつ	2	21.7	20.1	24.3	—
にしんのつ	3	21.7	19.0	26.4	0.2
たかつ	4	21.2	20.5	21.3	—
せいどまり	B	21.5	21.0	19.3	0.3
13号	10	21.2	21.5	20.3	—
20号	9	21.5	22.0	16.0	0.4
24号	8	21.2	22.0	17.7	—
ひゃっかん	5	21.4	22.6	14.5	0.5
22(1)号	6	21.1	21.9	16.9	—
25号	7	21.4	21.8	17.2	0.3
33号	16	21.5	22.5	14.9	—
43号	13	21.6	22.5	15.2	0.4
43号	14	20.9	22.1	17.7	—
44号	15	21.3	22.5	15.2	0.3
45号	C	21.7	23.1	12.8	—
平均		21.4	21.4	19.0	0.3

※ プランクトン沈殿量は速報値です。