

1 養殖概況

17日から1回目の摘採が始まりました。

2 海況（18日満潮時・右表）

水温：平均9.5℃と、平年より0.2℃低めでした。

比重：平均23.0でした。

栄養塩：平均8.3マイクロ（ $\mu\text{g}\cdot\text{at}/\text{L}$ ）でした。

プランクトン：主な種類は珪藻（コシノディスカス等）でした。

3 ノリの病害・生長など（18日調査）

- ・軽度な原形質吐出が3点（調査点7、9、13）で確認されました。
- ・アカ、ツボ、付着細菌は確認されませんでした。

4 今後の管理

- ・摘採可能な網は摘採を開始してください。
- ・クモリ、スミノリの発生が懸念されますので、1月22日を1回目の摘採終了の目安としてください。
- ・活性処理を行う場合は、200倍程度を目安とし、必ず再利用を行ってください。

1月18日（旧暦6日）の海況

漁場名	調査点	水温 ($^{\circ}\text{C}$)	比重	栄養塩 ($\mu\text{g}\cdot\text{at}/\text{L}$)	プランクトン ($\text{cc}/100\text{L}$)	葉長 (cm)
4号	1	9.4	23.1	7.5	0.5	30
6（2）号	12	9.6	23.0	6.8	—	23
七つはぜ	11	9.5	23.2	6.5	0.5	6
よりあわせ	A	8.3	20.5	18.8	—	20
えどなかつ	2	9.2	22.6	9.8	—	25
にしのつ	3	9.2	21.8	10.8	0.5	22
たかつ	4	9.4	22.9	7.3	—	10
せいどまり	B	9.5	22.9	6.5	0.8	12
13号	10	9.3	23.0	8.4	—	15
20号	9	9.5	23.0	9.2	0.3	20
24号	8	9.5	23.2	9.6	—	12
ひゃっかん	5	9.6	23.3	5.5	0.9	30
22(1)号	6	9.8	23.1	5.7	—	12
25号	7	9.6	23.4	6.7	0.4	20
33号	16	9.7	23.5	7.2	—	10
43号	13	9.5	23.3	7.6	0.4	30
43号	14	9.7	23.3	9.1	—	16
44号	15	9.8	23.7	7.9	0.4	6
45号	C	9.8	23.7	7.5	—	20
平均		9.5	23.0	8.3	0.5	18

※プランクトン沈殿量は速報値です