

1 採苗前日の注意点

ラッカサンにカキ殻を入れる際は、カキ殻の乾燥と地面の温度に注意してください。

2 採苗時の管理

- ・網の水位は、ハラで 1.5m を目安とし、採苗が終了したら 24 日までは、ハラで 2.0m を目安としてください。
- ・漁場によっては、低張りをすると比重の低い海水に浸かるため、タネがつきにくくなる恐れがあります。過度な低張りはしないでください。
- ・タネは午前10時頃まで付きます。
午前10時以降に切った網糸を検鏡し、芽数を判断してください。
- ・芽付きは、網糸 1 c mあたり 35~50 個が適正です。
(蛍光 100 倍 1 視野当たり、新型顕微鏡は 7~10 個、旧型顕微鏡は 5~7 個)
- ・芽付きが厚くならないよう適正数に達したら、すみやかにラッカサンをはずしてください。
- ・健全なノリ芽を育てるため、十分な干出を与えてください。

3 海況 (7日満潮時・右表)

水 温：平均 22.9℃と、平年並みでした。

比 重：平均 22.4 でした。

栄養塩：平均 12.5 マイクロ (μg・at/L) でした。

プランクトン：主な種類は珪藻 (スケルトネマ) でした。

研究所では、
10月10日(土)、11日(日)、17日(土) 9:00~12:00 に、
10月18日(日)14:00~16:00 に検鏡を実施します。
※新型コロナウイルス感染防止のためマスクの着用をお願いいたします。

10月7日 (旧暦21日) 満潮時の海況

漁場名	調査点	水温 (°C)	比重	栄養塩 (μg・at/L)	プランクトン (cc/100L)
4号	1	23.1	22.8	12.0	0.5
6 (2) 号	1 2	23.3	22.7	11.5	-
七つはげ	1 1	22.8	22.8	10.9	0.4
よりあわせ	A	22.1	19.3	25.0	-
えどなかつ	2	22.8	22.6	12.2	-
にしのかつ	3	22.5	21.0	19.3	0.5
たかつ	4	22.5	22.2	14.5	-
せいどまり	B	22.8	21.6	15.8	0.4
1 3号	1 0	22.5	22.3	14.6	-
2 0号	9	22.8	22.6	13.5	0.2
2 4号	8	22.7	22.8	12.9	-
ひゃっかん	5	23.3	23.0	11.1	0.3
2 2 (1) 号	6	23.2	22.8	9.5	-
2 5号	7	23.0	22.9	10.6	0.6
3 3号	1 6	23.3	22.9	9.2	-
4 3号	1 3	23.0	22.9	8.8	0.3
4 3号	1 4	23.0	23.3	9.0	-
4 4号	1 5	23.2	22.9	9.3	0.2
4 5号	C	23.2	23.0	8.2	-
平均		22.9	22.4	12.5	0.4

※ プランクトン沈殿量は速報値です。