

アカの感染を確認 網管理を徹底してください！

1月6日（旧暦6日）満潮時の海況

漁場名	調査点	水温 (°C)	比重	栄養塩 ($\mu\text{g}\cdot\text{at/L}$)	プランクトン (cc/100L)	アカ
4号	1	11.1	23.3	12.7	0.2	●
6(2)号	12	11.1	23.1	11.8	-	○
七つはぜ	11	11.1	23.0	12.8	0.2	○
よりあわせ	A	10.2	20.4	23.9	-	○
えどなかつ	2	10.7	22.8	15.0	-	○
にしのかつ	3	10.7	21.9	17.0	0.3	○
たかつ	4	10.9	22.5	14.3	-	○
せいどまり	B	10.9	22.3	15.1	0.1	○
13号	10	11.1	23.2	11.9	-	○
20号	9	10.8	23.1	16.9	0.1	○
24号	8	11.2	23.2	16.7	-	○
ひやっかん	5	11.1	22.7	13.5	0.2	○
22(1)号	6	11.2	23.0	12.3	-	○
25号	7	11.1	23.2	12.1	0.2	○
33号	16	11.2	23.2	12.8	-	○
43号	13	11.3	23.4	12.3	0.1	○
43号	14	11.3	23.4	12.7	-	○
44号	15	11.4	23.5	11.4	0.1	○
45号	C	11.5	23.3	11.0	-	○
平均		11.0	22.9	14.0	0.2	1/19地点

1 養殖状況

初摘採は2日から開始され、4日から本格化しています。

2 海況（6日満潮時・右表）

水温：平均11.0°Cで、平年より0.8°C高めでした。

比重：平均22.9でした。

栄養塩：平均14.0マイクロ($\mu\text{g}\cdot\text{at/l}$)でした。

プランクトン：少ない状況でした。

3 ノリの病害等（6日調査・右表）

- ・アカは19調査点中1地点で確認され、症状は軽度でした。
- ・ツボ、付着細菌は確認されませんでした。
- ・原形質吐出は19調査点中11地点で確認され、症状は軽度～中度でした。

4 今後の管理

- ・今後カラマに向かうため、アカの感染危険期となります。
- ・摘採サイズに達した網は長伸ばしをせず、速やかに摘採を行ってください。
- ・干出時間は、2～3時間を基本としてください。
- ・網の高さは、9日以降はハラで2.2mを目安とし、潮の引き具合、天候により現場で調整を行ってください。
- ・活性処理を行う場合、希釈倍率は200倍を目安とし、処理液の再利用を必ず行ってください。

※プランクトン沈殿量は速報値です。

アカの感染程度：● 軽度、○ 感染なし