

栄養塩が大幅に減少しています！

1月30日（旧暦30日）満潮時の海況

1 養殖状況

現在、4～5回目の摘採が行われています。

2 海況（30日満潮時・右表）

水 温：平均10.6℃で、平年より1.8℃高めでした。

比 重：平均23.0でした。

栄養塩：平均1.9マイクロ（ $\mu\text{g}\cdot\text{at/l}$ ）でした。

プランクトン：急激に増加していました。主な種類は、リゾソレニア、キートセロス等でした。

3 ノリの病害等（30日調査・右表）

- ・色落ちは19点中10点で確認され、程度は軽度～中度でした。
- ・アカは19点中9点で確認され、症状は軽度でした。
- ・ツボは19点中4点で確認され、症状は軽度でした。

4 今後の管理

- ・今後、さらに色落ちが拡大すると考えられます。
- ・早急に摘採を行ってください。
- ・色落ちが認められる網は、短めに摘採してください。
- ・色落ちした漁場でも海況が好転するまで、粘り強く干出管理を行ってください。
- ・網の高さはハラで2.2mを目安とし、潮の引き具合や天候によって現場で調整を行ってください。

漁場名	調査点	水温 (℃)	比重	栄養塩 ($\mu\text{g}\cdot\text{at/L}$)	プランクトン (cc/100L)	アカ	ツボ	色落ち
4号	1	10.3	18.1	22.3	11.3	●	○	○
6(2)号	12	10.4	23.5	0.0	-	○	○	○
七つはぜ	11	10.4	23.3	0.0	13.0	○	○	○
よりあわせ	A	10.4	20.2	10.4	-	●	○	○
えどなかつ	2	10.6	23.1	0.0	-	●	○	○
にしのつ	3	10.5	22.5	1.2	9.4	●	○	○
たかつ	4	10.4	23.0	0.0	-	●	○	●
せいどまり	B	10.4	23.1	1.8	8.8	●	○	○
13号	10	10.6	23.2	0.0	-	○	●	○
20号	9	10.8	23.5	0.4	23.0	○	○	●
24号	8	10.7	23.5	0.0	-	○	○	●
ひゃっかん	5	10.4	23.2	0.0	13.5	○	○	●
22(1)号	6	10.6	23.6	0.0	-	●	○	●
25号	7	10.5	23.6	0.0	24.0	●	○	▲
33号	16	10.7	23.8	0.0	-	○	●	▲
43号	13	10.8	24.0	0.0	13.1	○	●	●
43号	14	10.8	23.9	0.0	-	○	○	○
44号	15	10.9	24.0	0.0	10.2	○	○	●
45号	C	11.0	24.1	0.1	-	●	●	●
平 均		10.6	23.0	1.9	14.0	9/19地点	4/19地点	10/19地点

アカ・ツボの感染及び色落ち程度：▲ 中度、● 軽度、○ なし

※プランクトン沈殿量は速報値です。