

ノリ養殖情報 第6号

平成 25 年 11 月 8 日（採苗20日後）
福岡県水産海洋技術センター有明海研究所

1 養殖状況

3枚展開は6日までに概ね終了し、現在、網洗いや活性処理作業が行われています。

2 海況（8日満潮時・右表）

水 温：平均20.4℃で、平年より1.7℃高めでした。

比 重：平均22.6でした。

栄養塩：平均17.9マイクロ（ $\mu\text{g}\cdot\text{at/l}$ ）でした。

プランクトン：少ない状況でした。

3 ノリの生長など（8日調査、18調査地点）

- ・ノリ芽は最大35mm、平均22mmで、生長は平年よりも良好でした。
- ・二次芽の放出が増加していました。
- ・軽度の芽イタミが4地点で認められ、症状は死細胞、縮れでした。
- ・アオノリ、ヒゲの着生は認められませんでした。

4 今後の管理

- ・明日以降は、アカの感染危険期です。
- ・健全な冷凍網を確保するため、適切な干出管理に努めてください。
- ・網の高さは、ハラで1.8mを目安としてください。ただし、現場の潮高、天候、網の乾き具合をよく観察しながら網の高さを調整してください。

【アオノリ対策の活性処理】

- ・期間は11月7～13日です。
- ・アオノリの着生が多く認められる網のみ処理を行ってください。
- ・処理液は再利用を行い、廃液は必ず陸上で処分してください。海上への投棄は厳禁です。

11月8日（旧暦6日） 満潮時の海況

漁場名	調査点	水温 (℃)	比重	栄養塩 ($\mu\text{g}\cdot\text{at/L}$)	プランクトン (cc/100L)
4号	1	20.5	20.1	29.1	0.2
6(2)号	12	20.5	23.1	15.2	—
七つはぜ	11	20.4	23.0	15.8	0.2
よりあわせ	A	19.5	19.8	31.5	—
えどなかつ	2	20.0	22.4	19.8	—
にし の つ	3	20.2	22.3	20.7	0.3
たかつ	4	20.4	22.6	18.1	—
せいどまり	B	20.4	22.3	19.6	0.1
13号	10	20.3	22.4	18.5	—
20号	9	20.4	22.8	17.6	0.1
24号	8	20.5	22.9	19.0	—
ひゃっかん	5	20.5	22.9	16.5	0.1
22(1)号	6	20.6	23.3	14.9	—
25号	7	20.7	23.3	14.1	0.2
33号	16	20.6	23.3	14.4	—
43号	13	20.7	23.3	14.2	0.1
43号	14	20.7	23.3	13.7	—
44号	15	20.7	23.3	14.0	0.1
45号	C	20.7	23.4	13.1	—
平 均		20.4	22.6	17.9	0.1

※プランクトン沈殿量は速報値です。